



कृषि मौसम सेवा



कृषि जलवायु क्षेत्र गिर्द (मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, श्योपुर, अशोकनगर), विंध्य पठार (सागर, दमोह, भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा), मालवा पठार (उज्जैन, इन्दौर, मन्दसौर, रतलाम, शाजापुर, राजगढ़, देवास, नीमच), झाबुआ पहाड़ (झाबुआ, अलीराजपुर, धार) तथा निमाड़ घाटी (खरगोन, बुरहानपुर, हरदा, बड़वानी, खण्डवा) के लिये जारी।

मौसम पूर्वानुमान की वैधता: 24 – 28 मार्च, 2018

- ❖ गिर्द क्षेत्र में अधिकतम तापमान लगभग 35–37 °C एवं न्यूनतम तापमान लगभग 18–19 °C रहने की एवं वर्षा नहीं होने की संभावना है। आसमान साफ एवं हल्के बादल रहने की संभावना है।
- ❖ विंध्य पठार क्षेत्र में अधिकतम तापमान लगभग 35–37 °C एवं न्यूनतम तापमान लगभग 18–21 °C रहने की एवं वर्षा नहीं होने की संभावना है। आसमान साफ एवं हल्के बादल छाये रहने की संभावना है।
- ❖ मालवा पठार क्षेत्र में अधिकतम तापमान लगभग 36–38 °C एवं न्यूनतम तापमान लगभग 15–21 °C रहने की एवं वर्षा नहीं होने की संभावना है। आसमान में मध्यम हल्के बादल छाये रहने की संभावना है।
- ❖ झाबुआ पहाड़ क्षेत्र में अधिकतम तापमान लगभग 35–37 °C एवं न्यूनतम तापमान लगभग 19–20 °C रहने की एवं वर्षा नहीं होने की संभावना है। आसमान साफ एवं छुटपुट बादल छाये रहने की संभावना है।
- ❖ निमाड़ घाटी क्षेत्र में अधिकतम तापमान लगभग 35–38 °C एवं न्यूनतम तापमान लगभग 20–22 °C रहने की एवं वर्षा नहीं होने की संभावना है। आसमान साफ एवं हल्के बादल छाये रहने की संभावना है।

किसान भाईयों के लिए कृषि परामर्श:

गिर्द

- ❖ मूंग की बानी हेतु खाली हो रहे खेतों की तैयारी कर उन्नतशील प्रजातियां : टी.एम. जे.- 3 व एस.एम.एल. 668 आदि का चयन कर बोनी करें।
- ❖ लाकी, तोरई, कदमू में रेड पम्पकिन बीटल के नियंत्रण हेतु मिथायल पैराथियान 2 प्रतिशत धूल का भुरकाव करें।
- ❖ गोभी व बन्द गोभी में माहू के नियंत्रण हेतु नीम का तेल (इजेडिरेक्टिन) 1.5 से 2.0 लीटर 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टर छिड़काव करें।

विंध्य पठार

- ❖ लौकी, गिलकी, तोरई, खीरा, तरबूज, एवं खरबूज आदि में अधिक फूल लाने के लिए प्रारंभिक अवस्था में दो बार (2 पत्ती एवं 4 पत्ती अवस्था होने पर) इथेल 200 से 250 पी. पी. एम. अथवा 1 ग्राम दवा प्रति 4 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।
- ❖ ग्रीष्मकालीन मूंग की उन्नत जातियाँ जैसे पी. डी. एम-11, एच. यू. एस-1 जे. एम.721, टी.जे.एम.-1 एवं उडद की जातियाँ जवाहर उडद-2, पी.डी.यू.-1, टी.पी.यू.-4 इत्यादि के लिए खेत तैयार कर बुवाई करें।
- ❖ कद्दूवर्गीय सब्जियों एवं भिण्डी में लाल भृंग एवं बीटल्स आदि कीटों के नियंत्रण के लिए मिथाइल पैराथियान या क्विनाफॉस पाउडर 15 से 20 किलो प्रति हेक्टर का भुरकाव करें।
- ❖ खाली पडे हुए खेतों में पशुओं के लिए हरे चारे के लिए ज्वार चरी की बुवाई करें।

मालवा पठार

- ❖ गेंहूँ की फसल में दीमक के नियंत्रण हेतु क्लोरपायरीफॉस 20 ई. सी./20 ली./एकड़ 20 कि. ग्रा. बालू में मिलाकर खेत में छिड़क दें।
- ❖ किसान भाई सब्जियों के खेत की निराई -गुड़ाई करक खरपतवारों को निकालें।
- ❖ ग्रीष्म ऋतु में मूंग एवं उडद की फसल की बुवाई हेतु खेत की तैयारी करे एवं प्रमाणित स्त्रोत से उन्नत बीजों की व्यवस्था करें।
- ❖ पशुओं को साफ एवं ताजा पानी दिन में दो बार दें साथ ही हरा चारा दें तथा पशुशाला की नियमित साफ-सफाई रखें।

झाबुआ पहाड़

- ❖ ग्रीष्मकालीन कद्दूवर्गीय सब्जियों में लौकी, गिलकी, तोरई, खीरा, तरबूज, एवं खरबूज आदि में अधिक फूल लाने के लिए प्रारंभिक अवस्था में दो बार (2 पत्ती एवं 4 पत्ती अवस्था होने पर) इथेल 200 से 250 पी. पी. एम. अथवा 1 ग्राम दवा प्रति 4 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।
- ❖ कद्दूवर्गीय सब्जियों एवं भिण्डी में लाल भृंग एवं बीटल्स आदि कीटों के नियंत्रण के लिए मिथाइल पैराथियान या क्विनाफॉस पाउडर 15 से 20 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से भुरकाव करें।
- ❖ ग्रीष्मकालीन मूंग की उन्नत जातियाँ जैसे पी. डी. एम-11, एच. यू. एस-1 जे. एम.721, टी.जे.एम.-1 एवं उडद की जातियाँ जवाहर उडद-2, पी.डी.यू.-1, टी.पी.यू.-4 इत्यादि के लिए खेत तैयार कर बुवाई करें।
- ❖ खाली पडे हुए खेतों में पशुओं के लिए हरे चारे के लिए ज्वार चरी की बुवाई करें।

निमाड़ घाटी

- ❖ गर्मी की मूंग में बुवाई के 15–20 दिन के बीच इमाइजेथायपर 10 प्रतिशत एस.एल. शाकनाशी दवा 350 मिली/एकड़ की दर से भूमि में पर्याप्त नमी होने पर दें।
- ❖ पशुओं को किलनी एवं जू से रक्षा हेतु मेलाथियान/क्लीनर/ब्यूटाक्स का 2 मिली/लीटर पानी में घोल कर उनके शरीर के ऊपर लगाएं।